

ZÍSKEJTE AŽ 2 600 Kč NA OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKU B

PŘÍSPĚVEK NA OČKOVÁNÍ VAKCÍNOU BEXSERO® LZE ČERPAT PŘI SPLNĚNÍ TĚCHTO KRITÉRIÍ:

- Příspěvek je určen pro děti od 1 roku do nedovřených 16 let (15 + 364 dní), pojištěné u VZP ČR, které nemají evidovanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně, a jsou členy Klubu pevného zdraví.
- Zahájení 1. 9. 2015 a ukončení 30. 11. 2015 nebo po vyčerpání finančního limitu programu pro první 4 000 pojištěnců.
- O příspěvek je nutné požádat do 30. 11. 2015.

Až 2 600 Kč VZP přispěje:

- Na základě vyplněného vouchery získaného u lékaře.
- Po předložení originálního účetního/daňového dokladu o zaplacení očkovací látky Bexsero®. Doklad nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce.

Více informací o programu naleznete na:

www.vzp.cz/meningokok



VZP

POJIŠŤOVNA NA CELÝ ŽIVOT

infolinka: 952 222 222
www.vzp.cz

Program VZP ČR ve spolupráci s GlaxoSmithKline s.r.o.

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci vakcínou dostupnou na stránkách www.sukl.cz. Bexsero® je vakcína proti meningokokům skupiny B. Vakcína Bexsero® je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Vakcína není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař injekcí do svalů. O očkování se poradte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. Vakcinační akce schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZDRP01FUBHA). Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Vakcína v praxi nemusí chránit 100% očkovaných. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalové informaci přípravku. Případné nežádoucí účinky nám prosím nahláste na cz.safety@gsk.com. GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444, www.gsk.cz.



CZ/VAC/0102/15

MENINGOKOK SÉROSKUPINY B JE V SOUČASNOSTI V ČR NEJČASTĚJŠÍM PŮVODCEM MENINGOKOKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ.

JELIKOŽ MOHOU BÝT ČASNÉ PŘÍZNAKY NEMOCI PODOBNÉ CHŘIPCE, ROZPOZNÁ SE MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ ČASTO AŽ V POKROČILÉM STADIU.

Meningokoková onemocnění jsou závažné bakteriální infekce, které ohrožují zejména kojence, malé děti a dospívající. Nejčastěji se vyskytují ve formě zánětu mozkových blan (meningitida) nebo otravy krve (sepsis). V uplynulých 5 letech u nás závažnou meningokokovou infekcí onemocnělo mezi 42 a 85 osobami ročně a každý rok v těchto 5 letech v důsledku této infekce zemřelo mezi 5 až 9 pacienty.

Co je příčinou meningokokových onemocnění?

Meningokoková onemocnění se přenášejí kapénkovou infekcí z člověka na člověka, např.:

- líbáním
- kýčáním
- kašlem
- používáním společných předmětů

Většina kojenců a malých dětí se nakazí od členů rodiny, od osob, které o ně pečují, nebo v dětských kolektivech. Zdrojem nákazy jsou obvykle osoby, které samy nemají příznaky onemocnění, jsou „jen“ tzv. bacilonosiči. Meningokok u nich přežívá na sliznici nosohltanu.

Bakterie, které vyvolávají meningokoková onemocnění, se nazývají *Neisseria meningitidis*, krátce meningokoky. Z 5 nejdůležitějších séro skupin A, B, C, W135 a Y je v dnešní době v České republice nejrozšířenější meningokok skupiny B.

Upozornění: Záněty mozkových blan nebo otravy krve mohou způsobovat i jiní původci.

Proč je těžké je rozpoznat?

Meningokoková onemocnění mají zpočátku často nespecifické příznaky podobné chřipce, teplota, bolest hlavy, únava. Onemocnění může mít rychlý průběh a vyústit v ohrožení života. Z důvodu nespecifických příznaků jsou meningokoková onemocnění často rozpoznána až v pokročilém stadiu – až 15 hodin po nástupu prvních příznaků onemocnění.

Časné příznaky onemocnění	Příznaky v pokročilém stadiu onemocnění	
0 až 8 hodin	12 až 15 hodin	15 až 24 hodin
bolesti hlavy	vyrážka	zmatenost
horečka	změna barvy kůže	záchvaty, křeče
podrážděnost	ztuhlá šíje	bezvědomí
nechuť k jídlu	citlivost na světlo	
nevolnost a zvracení	studené ruce a nohy	
bolesti končetin		