

A young man and woman are shown from the back, looking through a large telescope. The man is on the left, wearing a blue denim shirt, and the woman is on the right, wearing a green and white striped shirt. They are both looking intently through the eyepiece of the telescope. The background is a blurred green wall.

**ZÍSKEJTE PŘÍSPĚVEK
AŽ 2 500 KČ
NA OČKOVÁNÍ CHLAPCŮ
PROTI HPV**

**Nemůžete jim zabránit,
aby vyrostli, ale můžete
je ochránit.**

Ochraňte své syny před závažnými
nádorovými onemocněními, která
jsou způsobena některými typy HPV.

www.vzp.cz/hpv-chlapci

 **VZP**
POJIŠŤOVNA NA CELÝ ŽIVOT

infolinka: 952 222 222
www.vzp.cz

- Program je určen **pro chlapce ve věku od 9 let do dosažení 14 let**, kteří jsou pojištěni u VZP a jsou členy Klubu pevného zdraví.
- **Maximální výše příspěvku je 2 500 Kč.**
- Příspěvek je určen pouze na očkovací látku Silgard, není určen na její aplikaci.
- Očkování vakcínou Silgard je pro věkovou skupinu 9-14 let **dvoudávkové** (druhá dávka s odstupem 6 měsíců). Provedené očkování chrání proti onemocněním souvisejícím s **infekcí HPV** (tj. Human Papillomavirus), mj. před análním karcinomem a genitálními bradavicemi.
- Program je platný **od 1. 2. 2016**, o příspěvek je možné žádat nejdéle **do 30. 11. 2016** nebo do vyčerpání stanoveného limitu **pro prvních 8 000 klientů**.
- **Aplikace očkovací látky musí být provedena praktickým lékařem pro děti a dorost nebo lékařem v očkovacím centru.**
- Pro poskytnutí příspěvku je třeba předložit **originální doklad o nákupu očkovací látky Silgard a potvrzení o aplikaci v době trvání programu s uvedením jména a čísla pojištěnce.**
- O příspěvek žádá zákonný zástupce dítěte.

Více informací o programu a jeho podmínkách získáte na www.vzp.cz/hpv-chlapci.



Silgard®, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.

Očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná).

Vakcína Silgard® se podává injekčně ve 2 dávkách (u dětí před dosažením 14. narozenin) nebo ve 3 dávkách. **Tak jako všechny očkovací látky ani vakcína Silgard® nemusí plně ochránit každého.** U více než 1 z 10 pacientů se objevily nežádoucí účinky v místě vpichu injekce zahrnující bolest, otok a zarudnutí. Také byly pozorovány bolesti hlavy. Dále byly hlášeny nežádoucí účinky v nižších frekvencích po uvedení přípravku na trh. **Přípravek je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku. Případný výskyt nežádoucích účinků hlase svému ošetřujícímu lékaři. Vakcinační akce schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR, č.j.: MZDR77954/2015-3/OVZ.**